



পার্কিনসন রোগে ইনফিউশন থেরাপি: রোগীদের জন্য অতি বিশেষ কীয় তথ বলী

পার্কিনসন রোগে ঔষধের ভূমিকা কী?

পার্কিনসন রোগীদের মতিকে যথেষ্ট পরিমাণ ডোপামিন নামক রাসায়নিক পদার্থ থাকে না। ঔষধ পার্কিনসন রোগের লক্ষণসমূহ কমাতে সহায়তা করে। অধিকাংশ ঔষধ দিনে বেশ কয়েকবার মুখে গ্রহণ করতে হয়। প্রথম যখন আপনি ঔষধ গ্রহণ শুরু করেন, তখন ঔষধের প্রভাব সাধারণত সারাদিন বজায় থাকে; যাহাকে পার্কিনসন রোগ বৃক্ষি পাবার সাথে সাথে আপনি লক্ষণ করে থাকবেন যে পরবর্তী ডোজ নেবার পূর্বেই ঔষধের কার্যকারিতা কমে গেছে। এটাকে বলা হয় “উইয়ারিং অফ” (Wearing OFF)। যখন “OFF”, বা “বন্ধ” সময়, তখন পার্কিনসন রোগের লক্ষণসমূহ যেমন কম্পন, দীরগতি এবং চলাচলে অসুবিধা ফেরত আসে। যখন ঔষধ গ্রহণ করা হয় তখন “ON” বা “চালু” সময়, লক্ষণসমূহ কমে যায়। এর ফলে ঔষধ বার বার নিতে হয় এবং রোগের লক্ষণসমূহের উপরে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কমে যায়।

পার্কিনসন রোগের চিকিৎসায় ইনফিউশন থেরাপি কি?

ইনফিউশন থেরাপি এক ধরণের চিকিৎসা যেখানে ত্বকের নিচে ছোট সুই দিয়ে অথবা নলের (Catheter) মাধ্যমে আপনার ক্ষুদ্রাত্মে ঔষধ প্রবেশ করানো হয়। এর মাধ্যমে সারাদিন নিরবিচ্ছিন্নভাবে ঔষধ প্রদান করা যায়। লিভোডোপা (Levodopa) এবং অপোমরফিন (Apomorphine) হচ্ছে এই চিকিৎসায় ব্যবহৃত দুটি ঔষধ যা মতিকে ডোপামিন এর ঘাটতি পূরণ করে থাকে।

- লিভোডোপাঃ এই ঔষধটি মতিকে ডোপামিন এ ক্লোনাস্পারিনেট হয়। এটি পার্কিনসন রোগে সবচেয়ে ব্যবহৃত ঔষধ। এটি (OFF) সময় কমাতে “ইনফিউশন থেরাপি” চিকিৎসায় ক্ষুদ্রাত্মে “লিভোডোপা/ কারভিডোপা (LCIG) আন্তরিক জেল আকারে ব্যবহার করা হয়।
- অপোমরফিন এই ঔষধটি ডোপামিন এর অনুরূপ মতিকের কোষের ওপর কাজ করে। এটা চামড়ার নিচে একবার ইনজেকশন আকারে অথবা নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রদান করা যায়। এটা OFF সময় কমাতে সাহায্য করে।

LCIG ও অপোমরফিন উভয় ঔষধ নলযুক্ত বাহি'ক বহনযোগ “পাম্পে সংরক্ষিত থাকে। LCIG পাম্পনল ক্ষুদ্রাত্মে যুক্ত নল এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় যা লিভোডোপা সরবরাহ করে। অপোমরফিন পাম্প নলটি ত্বকের নিচে পাতলা সুঁচের মাধ্যমে প্রদান করা হয় যা আঠা দিয়ে ত্বকের নিচে সংযুক্ত থাকে।

ইনফিউশন থেরাপি ব্যবহার করবেন কেন?

যখন আপনি “Wearing off” এ ভোগেন তখন আপনার মতিকের কোষ লিভোডোপা শোষণ অথবা সঞ্চয় করতে পারে না। এর ফলে আপনি আপনার রোগের লক্ষণসমূহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না এবং আপনাকে দিনের বেলা বারবার ঔষধ গ্রহণ করতে হয়। ইনফিউশন থেরাপি অবিরতভাবে ঔষধ প্রদান করে এবং ধারাবাহিক ও নির্ভরযোগ্যভাবে রোগের লক্ষণসমূহ উপশম করে। ইউফিউশন থেরাপী বারবার মুখে ঔষধ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দেয়। ইনফিউশন থেরাপী মুখের দীর্ঘমেয়াদী বড়ি এবং পাচ (Patch) এর চেয়ে অধিকতর কার্যকর।

কঠদেও বেত্রে এই ডচডকজগঠ ইন্ডিত ডটডেচিট কওঠ উচ্চত?

ইনফিউশন থেরাপী বিবেচনা করা হয় যখন মুখে গ্রহীত ঔষধের কার্যক্ষমতা থাকে কিন্তু সময়সীমা কমে যা (Wearing off) অথবা ঔষধের কারণে ডিসকাইনেশিয়া (অতিরিক্ত ঔষধ গ্রহনের ফলে শারীরিক অনয়ন্ত্রিত নড়াচড়া বৃদ্ধি) হয়। ইনফিউশন থেরাপী শুরু করার আগে অধিকাংশ রোগী সাধারণতঃ মুখে গ্রহীত বিভিন্ন ঔষধ বা পাচ (Patch) চিকিৎসা করে থাকেন।

এটা মনে রাখা জরুরী, যদি মুখে খাবার ঔষধ সেবনে রোগের লক্ষণ বিস্মুত্ব উন্নতি না হয় তাহলে ইনফিউশন থেরাপীর কথা বিবেচনা করা যাবে না।

কোথায় এই চিকিৎসা দেয়া হয়?

সাধারণত এই চিকিৎসা হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায় অথবা কখনও কখনও বহিত্বিভাগ ক্লিনিকে শুরু করা হয়ে থাকে LCIG বংশীয়, ডাঙ্গার আপনার অন্তে একটি নল প্রবেশ করিয়ে চিকিৎসা শুরু করে থাকেন। অপোমরফিন চিকিৎসায় আপনাকে কয়েক দিন হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিতে হতে পারে অথবা বহিত্বিভাগেও এ চিকিৎসা নেয়া যেতে পারে। ইনফিউশন থেরাপী সাধারণত সকালে শুরু হয়ে রাতে শেষ হয়। প্রথম কয়েক মাস ঔষধ এর মাত্রা সমন্বয় করতে ডাঙ্গার বা নার্স আপনাকে সহায়তা করবেন।

এই চিকিৎসা পদ্ধতির মূল সীমাবদ্ধতা কি এবং কি জটিলতা হতে পারে?

- ইনফিউশন থেরাপী সারা বিশ্বে সহজলভ্য নয়; কিছু কিছু দেশে এই চিকিৎসা রয়েছে।
- বড়ি ও পাচ চিকিৎসার চেয়ে এই চিকিৎসা অনেক ব্যবহৃত যা এর সহজলভ্যতা সীমিত করেছে।
- চিকিৎসা বংশীয় প্রক্রিয়া অপোমরফিন চিকিৎসাকে জটিল করতে পারে।
- LCIG টিউব যখন চুকানো হয় তখন কারিগরি সমস্যা হতে পারে।
- চামড়ার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া অপোমরফিন চিকিৎসাকে জটিল করতে পারে।

LCIG এবং অপোমরফিন চিকিৎসায় পার্কিনসন রোগের অন্তর্ভুক্ত পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া রয়েছে, যেমন:-

- বমি ভাব
- তন্ত্রা ভাব
- নিম্ন রক্তচাপ
- বিভ্রান্তি
- মতিভ্রংশ (Hallucination)

বিশেষ করে, যদি অন্তর্ভুক্ত চিকিৎসায় সমস্যা হয়ে থাকে, তবে এই লক্ষণসমূহ হয়।